

Les incontournables de la prise en charge d'un cas de gale au domicile



A FAIRE



NE PAS FAIRE

Dès la suspicion

(association d'un prurit (à recrudescence nocturne) et présence de lésions cutanées (eczématiformes et de grattage).



Mettre en place les Précautions complémentaires contact « gale » :

- Réaliser une hygiène des mains par lavage simple (eau + savon) et si nécessaire FHA à distance sur des mains parfaitement sèches
- Porter les EPI dès la prise en charge du patient (surblouse à manches longues et gants à UU)
- Prendre en charge les textiles pour un traitement adapté
- Arrêter les activités extérieures pour le cas
- Demander une confirmation par un dermatologue de la pathologie

Il ne faut pas :

- Attendre le diagnostic de gale pour mettre en place les mesures
- Utiliser exclusivement la solution hydro alcoolique
- Ne pas se protéger avec des EPI dès la prise en charge de la personne

Repérage des contacts



Définir les contacts :

- 1^{er} cercle : personnes ayant eu un contact cutané prolongé avec la personne atteinte
- 2^{ème} cercle : personnes vivant ou travaillant dans la même collectivité
- 3^{ème} cercle : personnes visitant occasionnellement et entourage familial des personnes fréquentant régulièrement la collectivité.

Il ne faut pas oublier :

- La famille
- Les autres professionnels

Mise en place des traitements



Réaliser un traitement médicamenteux collectif :

- Le même jour pour le cas et les contacts à renouveler entre J8 et J14 (idéalement J10) :
 - Gale commune : traitement des contacts du 1^{er} cercle.
 - Gale profuse, hyperkératosique ou épidémique : traitement de tous les contacts du 1^{er} et 2^{ème} cercle, voire le 3^{ème} cercle

Associer le traitement du linge et de l'environnement :

- 12h après la prise médicamenteuse

Il ne faut pas :

- Traiter uniquement le cas
- Réaliser qu'une seule prise de traitement médicamenteux
- Réaliser un traitement collectif non simultané (cas + contact)

Identifier le linge utilisé (vêtements, linge de toilette et literie) :

- Linge porté dans les 3 derniers jours (8 derniers jours si gale profuse ou hyperkératosique)

Traitement du linge :

- Lavage à 60°
- Sinon utiliser un produit acaricide ou mettre en quarantaine dans un sac fermé pendant 3 jours

Il ne faut pas oublier :

- Les chaussons
- Les objets et les surfaces en tissu non lavables